

پاسخ به پرسش های رایج در مورد کیست هیداتید

مهمترین راه های انتقال بیماری چیست؟

دفع تخم های کرم بالغ در سگ های آلوده باعث آلودگی خاک و آب می شود و حیوانات اهلی مانند گوسفند، بز، گاو و شتر (میزبان واسطه) هنگام چریدن تخمها را میخورند و انسان به طور تصادفی از طریق خوردن غذا یا آب آلوده به تخم ها و یا از طریق تماس مستقیم با سگ های آلوده به انگل آلوده می شود

آیا علائم بیماری را می شناسید؟

پس از بلع تخم هر اندامی از بدن می تواند محل بوجود آمدن کیست باشد و بسته به اینکه در چه اندامی کیست ایجاد شده اختلال در عملکرد عضو را داریم. کیست های ریوی و کبدی معمولاً شایع تر هستند. علائم بیماری نیز بستگی به عضو درگیر - اندازه کیست و محل دقیق آن در عضو مبتلا - واکنش های بین کیست و عضو مبتلا - پاره شدن کیست و واکنش های ایمنولوژیک به دنبال آن مثل شوک آنافیلاکسی و غیره دارد

چگونه از ابتلاء به بیماری جلوگیری کنیم؟

- رعایت بهداشت فردی و محیط
- ضد عفونی نمودن سبزیجات
- محصور نمودن مزارع کشت سبزیجات
- معدوم ساختن اندام های آلوده به کیست هنگام ذبح دام
- خوراندن داروهای ضد انگلی به سگ های شناسنامه دار و گله
- عدم تماس با سگ سانان
- درمان سگ های آلوده صاحب دار
- کشتن سگ های ولگرد
- کشتار دامها در کشتار گاه های بهداشتی
- کشتار دام ها در سنین پایتتر (ممانعت از بزرگ شدن کیست ها)

- دفع بهداشتی امعاء و احشا

- عدم تغذیه سگ ها با مانده امعاء و احشای کشتارگاهی

- آموزش همگانی در مورد راه انتقال و انتشار بیماری